

ভূৰপোকৰ সুসংহত নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰণালী



ড° ৰাদল ভট্টাচাৰ্য
সুধাংশু ভাগৱতী
ড° খনিন পাঠক

শ্রিন্ঘা ভট্টাচাৰ্য
ড° হিমাংশু মিশ্র
পাৰ্থপ্ৰতিম জ্ঞানোদয় দাস



সর্বভাৰতীয় আঁচনি-ভূমিজ সঞ্চিপনী অপ্রাণী
পতংগতত্ত্ব বিভাগ
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, যোৰহাট-৭৮৫০১৩



ভূরপোক কি ?

ভূরপোক পতংগৰ পখিলাবৰ্গৰ (Lepidoptera) অন্তর্ভুক্ত এবিধ অনিষ্টকাৰী পোক। ভাৰতবৰ্ষত ভূরপোকৰ বহুকেইটা প্ৰজাতি আছে যদিও অসমত এগ্ৰোটিছ যিপচিলন (Agrotis ipsilon) নামৰ প্ৰজাতিবিধহে যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায়। ভূরপোকে বিভিন্ন বিশিষ্য যেনে আলু, মাকে, জলকীয়া, কবিজাতীয় শস্য, বুটমাহ, মটৰ মাহ, মচুৰ আদিৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে। ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন ফুল আৰু পুলিবাৰীতো ইহাঁত উপদ্রব দেখা যায়। বানান্ত অঞ্চলত সাধাৰণতে ভূরপোকৰ প্ৰাদুৰ্ভাৰ বেছি হয়।

কেনেকৈ ক্ষতিসাধন কৰে ?

ভূরপোকৰ পলুবোৰ দিনৰ ভাগত মাটিৰ তলত লুকাই থাকে আৰু সন্ধিয়াপৰত মাটিৰ পৰা সক্ৰিয় হৈ ওলাই আছে। ভূরপোকে আলুখেতিৰ পুলিবোৰ গুৰিতে কাটি দি কোমল অংশবোৰ খায় আৰু বহুসংখ্যক পুলি এনিশাতে কাটি পেলাব পাৰে। ইহাঁতবোৰে পূৰ্বঠ হোৱা আলুবোৰো ফুটা কৰি খায় আৰু আক্ৰান্ত আলুবোৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে অনুপযোগী হৈ পাৰে। আক্ৰান্ত আলুবোৰ বজাৰৰ মূল্য হ্ৰাস পায়। আলুৰ বাহিৰে ওপৰত উল্লিখিত শস্যসমূহৰ পুলিবোৰো গুৰিতে কাটি শস্যৰ প্ৰচুৰ ক্ষতি সাধন কৰে।



আক্ৰান্ত আলুৰ পুলি



আক্ৰান্ত আলু



আক্ৰান্ত গুজি তিলৰ পুলি



আক্ৰান্ত জলকীয়া পুলি

জীরন চক্রঃ

শীতৰ আগমনৰ লগে লগে ভুৰপোকৰ পথিলাবোৰ সক্ৰিয় হৈ সাধাৰণতে সেমেকা ঠাইত কণী পাৰে। মাইকী পথিলাবোৰে প্ৰায় ২৮টা মান কণী পাৰে আৰু কণীবোৰ ৫-১০ দিনৰ ভিতৰত পূৰ্ণ হৈ প্ৰথম স্তৰৰ পলুৰ জন্ম হয়। পলুবোৰৰ ৫টা স্তৰ ২৮ৰ পৰা ৩৫ দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈ লেটালৈ (১২-১৫ দিন) বৰ্গান্তৰিত হয়। এনেদৰে ইহঁতৰ এটা জীৱন চক্ৰ সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ প্ৰায় ৪০-৫০ দিন মানৰ প্ৰয়োজন হয়।



মতা পথিলা



মাইকী পথিলা



কণী



পলু



লেটা

সুসংহত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থারলী

- সন্ধিয়া পোহৰ ফান্দৰ (Light trap) দ্বাৰা নতুবা শস্যডৰাৰ আশে-পাশে জুই ধৰি ভূৰপোকৰ পথিলাবোৰক পোহৰলৈ আকৰ্ষিত কৰি ধৰংস কৰিব পাৰি।
- ৰাতিপুৱা খেতিডৰা পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়ত গুৰি কাটি থোৱা পুলিবোৰৰ ওচৰৰ মাটিখিনি খান্দি (৫-১০ ছেঁমিঃ) পলুবোৰ উলিয়াই মাৰি পেলাব লাগে।
- বিভিন্ন অৰ্থকৰী শস্যৰ পুলিবোৰ ভূৰপোকৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ বাঁহ বা পি. ভি. চি. পাইপৰ বিং বনাই (১০ছেঁমিঃ ব্যাস) ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি।
- পথাৰডৰা ৰদৰ বতৰত দকৈ হাল বাই ল'ব লাগে। ইয়াৰ ফলত মাটিৰ ভিতৰত সোমাই থকা পলু আৰু লেটাবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহে আৰু ইহঁতবোৰক তেতিয়া বিভিন্ন কীটভোজী চৰাইয়ে ভক্ষণ কৰে। সেয়েহে খেতি পথাৰডৰাত চৰাইৰ আগমনৰ বাবে বাহৰ জেং আদি পুতিৰ লাগে।
- আলুখেতিৰ মাটি চপোৱাৰ সময়ত ঢাপবোৰ ওখকৈ (৮-১০ ছেঁমিঃ) ৰাখিলে ভূৰপোকৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰি।
- খেতিডৰাত যদি পানী জমা হৈ থাকে তেন্তে অতি সোনকালে জলনিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।
- মাজে-সময়ে খেতিডৰাৰ অপত্তণবোৰৰ নিৰণিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।
- মাটি চহোৱাৰ সময়ত সৰিয়হৰ খলিহৈ প্ৰতি হেষ্ট্ৰ মাটিত প্ৰায় ১৫০ কেজিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে।
- ভূৰপোকবোৰক কিছুমান ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ মিশ্রণ ‘আকৰ্ষক’ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি ধৰংস কৰিব পাৰি। মিশ্রণটো তলত উল্লেখ কৰা ধৰণে বনাব পাৰিঃ বেচন (১ কেজি) + গুৰ (১০০ গ্ৰাম) + ইষ্ট ভেকুৰ (১ গ্ৰাম) + ক্লৰপাইৰিফচ (১ মিঃ লিঃ)।
- পতংগ নিয়ন্ত্ৰক হিচাপে বিভিন্ন ভেকুৰ যেনে বিউভেৰিয়া বেচিয়ানা আৰু মেটাৰহিজিয়াম এনিচপ্পি প্ৰতি বৰ্গ মিটাৰত ১০ গ্ৰামকৈ প্ৰয়োগ কৰিলে সুফল পোৱা যায়।
- শস্য ৰোপণ কৰাৰ আগেয়ে মাটিত লুৰ খান্দি কুইনলফছ ২৫ ই.চি. নতুবা ক্লৰ’পাইৰিফছ ২০ ই.চি. ১.৫-২ মিঃলিঃ প্ৰতি লিটাৰ পানীত মিহলাই প্ৰয়োগ কৰি আলুৰ বীজ ৰোপণ কৰিলে ভূৰপোকৰ উপদ্রুৰ বল্হথিনি কম হোৱা দেখা যায়।



যিহেতু ভূৰপোকবোৰ সন্ধিয়া সময়তহে সক্ৰিয় হৈ ক্ষতিসাধন কৰে সেয়েহে উল্লিখিত কীটনাশক দ্ৰব্যবোৰ সন্ধিয়া সময়ত পথাৰত স্প্ৰে হিচাপে প্ৰয়োগ কৰিলে সুফল পোৱা যায়।